


FACTS ABOUT EAR INFECTIONS



Ear infections are common in children. Most children will have at least one ear infection before their third birthday. Children usually get an ear infection after they've had a cold, but it's easy to mistake one for the other. This is because they have many similar symptoms including fever, loss of energy and loss of appetite. A cold usually goes away on its own but an ear infection is more difficult to get rid of because it's caused by bacteria. Many doctors treat an ear infection with antibiotics and may also suggest a pain reliever. Most ear infections are not serious but sometimes problems such as hearing loss can occur.



Sometimes, an ear infection can cause liquid to collect inside the ear. This is called "otitis media". This liquid may stay in the ear for as long as 3 months. Children with otitis media don't have a fever or an ear ache but their hearing could be affected. A child with otitis media may show some of the following symptoms:

- Pulls or scratches his ears
- Has no energy
- Misunderstands directions
- Doesn't pay attention to you
- Wants the TV or radio louder than normal

If you think your child has an ear infection or otitis media, see your doctor. Any amount of hearing loss can affect your child's ability to learn speech and language.

For more information, call Ottawa Public Health Information at 580-6744 and speak to a Public Health Nurse about your child's speech and language development and the First Words program.



first
words

Checkout our webpage - www.pqhcs.com - follow the links to First Words

FAITS AU SUJET DES INFECTIONS DE L'OREILLE

- Les infections de l'oreille sont fréquentes chez les enfants. La plupart des enfants en auront eu au moins une dès l'âge de trois ans.
- Elles se produisent généralement après un rhume, mais attention: beaucoup des symptômes sont les mêmes: fièvre, manque d'énergie, perte d'appétit.
- Alors que les rhumes disparaissent d'eux-mêmes, il est plus difficile de se débarrasser d'une infection de l'oreille parce qu'elle est causée par des bactéries. Les médecins les soignent souvent à l'aide d'antibiotiques. Ils peuvent aussi recommander l'usage d'un calmant pour réduire la douleur. La plupart des infections de l'oreille ne sont pas graves, mais dans certains cas, elles peuvent causer la perte de l'ouïe.



Parfois, une infection de l'oreille peut causer une accumulation de liquide dans l'oreille. Ce liquide peut y demeurer jusqu'à trois mois sans signe d'infection. Il s'agit alors d'une «otite moyenne». Les enfants atteints de cette maladie n'auront ni fièvre ni douleur mais leur sens de l'ouïe sera affecté. Voici ses symptômes:

votre enfant...

- se tire les oreilles ou se gratte autour des oreilles
- est agité
- comprend mal les directives
- ne porte pas attention
- demande d'augmenter le volume de la télévision ou de la radio.

Si vous pensez que votre enfant a une infection de l'oreille ou une otite moyenne, contactez votre médecin. **Toute diminution de l'ouïe peut affecter la capacité de votre enfant à développer sa parole et son langage.**



Pour en savoir davantage, appelez Info-santé publique Ottawa, au 580-6744, et demandez à parler à une infirmière de santé publique concernant le développement du langage chez votre enfant et le programme Premiers mots.

Visitez notre page web—www.pqhcs.com—suivez les liens vers Premier mots



**premiers
mots**